VAROTOIMET TAULUKOSSA siivousohjekooste laitoshuollolle 11/2026

VARO-TOIMI-LUOKAT	MIKROBI/TAUTI	SUOJAIMET JA KÄSIHYGIENIA	SIIVOUSAINE ylläpitosiivous	SIIVOUSAINE loppusiivous	ERITETAHRAT	LIKAPYYKIN KÄSITTELY	Noco-spray	Loppu-siivous: väliverho-jen vaihto	MUUTA HUOMIOITAVAA
KOSKETUS	**SUORA SAIRAALA-SIIRTO ULKOMAILTA**	Pitkähihainen suojatakki/essu ja suojakäsineet. Käsihuuhde	Oxivir Plus 15% tai Klorilli 1000 ppm	Oxivir Plus 15% tai Klorilli 1000 ppm	Oxivir Sporaside 6% (valmis käyttöliuos), Klorilli 1000 ppm, Oxivir Plus 15%	normaali käytäntö			
	MRSA	Ptkähihainen suojatakki/ essu ja suojakäsineet. Jos hilseilevä ➞ kirurginen suu-nenäsuojain. Käsihuuhde.	heikosti emäksinen yleispuhdistusaine	Oxivir Plus 3,5% tai Klorilli 1000 ppm	Oxivir Sporaside 6% (valmis käyttöliuos), Klorilli 1000 ppm, Oxivir Plus 15%	INFEKTIOPYYKKI		x	
	Acinetob.baumannii (Acin MDR)	Pitkähihainen suojatakki/essu ja suojakäsineet. Käsihuuhde	Oxivir Plus 3,5 % tai Klorilli 1000 ppm	Potilash: Oxivir Plus 3,5%/ Klorilli 1000 ppm, saniteettitilat: Klorilli 1000 ppm	Oxivir Sporaside 6% (valmis käyttöliuos), Klorilli 1000 ppm, Oxivir Plus 15%	normaali käytäntö	x	x	
	PseuMDR	Pitkähihainen suojatakki/essu ja suojakäsineet. Käsihuuhde	heikosti emäksinen yleispuhdistusaine + saniteettitilat: desinfioiva puhdistusaine tai Oxivir Plus 3,5%	Potilash: Oxivir Plus 3,5%/ Klorilli 1000 ppm, saniteettitilat: Klorilli 1000 ppm	Oxivir Sporaside 6% (valmis käyttöliuos), Klorilli 1000 ppm, Oxivir Plus 15%	normaali käytäntö	x	x	
	VRE	Pitkähihainen suojatakki/essu ja suojakäsineet. Käsihuuhde	Oxivir Plus 3,5% tai Klorilli 1000 ppm	Oxivir Plus 3,5% tai Klorilli 1000 ppm	Oxivir Sporaside 6% (valmis käyttöliuos), Klorilli 1000 ppm, Oxivir Plus 15%	normaali käytäntö	x	x	
	TÄI/SYYHY/LUDE	Pitkähihainen suojatakki/essu ja suojakäsineet. Käsihuuhde	heikosti emäksinen yleispuhdistusaine + kertakäyttöiset siivouspyyhkeet+mopit	heikosti emäksinen yleispuhdistusaine + kertakäyttöiset siivouspyyhkeet+mopit	Oxivir Sporaside 6% (valmis käyttöliuos), Klorilli 1000 ppm, Oxivir Plus 15%	INFEKTIOPYYKKI			TÄI ➞ tavanomaiset varotoimet, LUDE ➞ ilmoitus tuholaistorjunta yritykseen, huonetta ei tyhjennetä ennen tuholaistorjuntaohjeita
	Candida auris	Pitkähihainen suojatakki/essu ja suojakäsineet. Käsihuuhde	Oxivir Plus 15 % tai Klorilli 1000 ppm Kantajan + altistuneen huoneen siivous 2 x pvä	Oxivir Plus 15% tai Klorilli 1000 ppm	Oxivir Sporaside 6% (valmis käyttöliuos), Klorilli 1000 ppm, Oxivir Plus 15%	INFEKTIOPYYKKI	x	x	Loppusiivouksessa konsultoi hygieniahoitajaa irtotavaroiden hävittämisestä
	ESBL E.Coli	Pitkähihainen suojatakki/essu ja suojakäsineet. Käsihuuhde	heikosti emäksinen yleispuhdistusaine	heikosti emäksinen yleispuhdistusaine	Oxivir Sporaside 6% (valmis käyttöliuos), Klorilli 1000 ppm, Oxivir Plus 15%	normaali käytäntö			Tavanomaiset varotoimet riittää, jos potilas ei tuhri eritteillään. Jos potilas on tuhriva => kosketusvarotoimet
	ESBL Klebsiella pneumoniae	Pitkähihainen suojatakki/essu ja suojakäsineet. Käsihuuhde	heikosti emäksinen yleispuhdistusaine + saniteettitilat: desinfioiva puhdistusaine tai Oxivir Plus 3,5%	Potilash: Oxivir Plus 3,5%/ Klorilli 1000 ppm, saniteettitilat: Klorilli 1000 ppm	Oxivir Sporaside 6% (valmis käyttöliuos), Klorilli 1000 ppm, Oxivir Plus 15%	normaali käytäntö	x	x	Kosketusvarotoimet
	CPE	Pitkähihainen suojatakki/essu ja suojakäsineet. Käsihuuhde	heikosti emäksinen yleispuhdistusaine + saniteettitilat: desinfioiva puhdistusaine tai Oxivir Plus 3,5%	Potilash: Oxivir Plus 3,5%/ Klorilli 1000 ppm, saniteettitilat: Klorilli 1000 ppm	Oxivir Sporaside 6% (valmis käyttöliuos), Klorilli 1000 ppm, Oxivir Plus 15%	INFEKTIOPYYKKI	x	x	
	* HUOM! ESBL Klebsiella, CPE, Acin MDR- ja Pseu MDR-kantajan huoneen loppusiivous ➞ potilashuone: Oxivir 3,5 %, saniteettitilat: Klorilli 1000 ppm. Käytä suojalaseja, hengityssuojainta ja kestokäyttöisiä suojakäsineitä, kun käsittelet laimentamatonta puhdistusainetta!								

	Clostridioides difficile (gastroenteriitti)	Pitkähihainen suojatakki/essu ja suojakäsineet. Kirurginen suu-nenäsuojain. **Käsienpesu** ja käsihuuhde.	Oxivir Plus 15 %, Klorilli 1000 ppm	Oxivir Plus 15 %, Klorilli 1000 ppm	Oxivir Sporaside 6% (valmis käyttöliuos), Klorilli 1000 ppm, Oxivir Plus 15%	INFEKTIOPYYKKI	x	x	Nocotus - muista hyvä mekaaninen siivous! Konsultoi tarvittaessa INTAR.
	Noro (gastroenteriitti)	Pitkähihainen suojatakki/essu ja suojakäsineet. Kirurginen suu-nenäsuojain. **Käsienpesu** ja käsihuuhde.	Oxivir Plus 15 %, Klorilli 1000 ppm	Oxivir Plus 15 %, Klorilli 1000 ppm	Oxivir Sporaside 6% (valmis käyttöliuos), Klorilli 1000 ppm, Oxivir Plus 15%	INFEKTIOPYYKKI	x	x	Nocotus - muista hyvä mekaaninen siivous! Konsultoi tarvittaessa INTAR.
KOSKETUS/ILMA	**Vyöruusu ja vesirokko**	Pitkähihainen suojatakki/essu suojakäsineet. Käsihuuhde. FFP3 hengityssuojain	heikosti emäksinen yleispuhdistusaine	heikosti emäksinen yleispuhdistusaine	Oxivir Sporaside 6% (valmis käyttöliuos), Klorilli 1000 ppm, Oxivir Plus 15%	normaali käytäntö			Vesirokossa henkilökunnan tulee olla sairastanut vesirokon tai olla rokotetu vesirokkoa vastaan!
KOSKETUS/ILMA	**Tuhkarokko**	Pitkähihainen suojatakki/essu suojakäsineet. Käsihuuhde. FFP2 tai FFP3 hengityssuojain	heikosti emäksinen yleispuhdistusaine	heikosti emäksinen yleispuhdistusaine	Oxivir Sporaside 6% (valmis käyttöliuos), Klorilli 1000 ppm, Oxivir Plus 15%	normaali käytäntö			Siivouksen voi suorittaa heti FFP2/FFP3 suojaimien kanssa, huone pidetään siivouksen jälkeen suljettuna 2 tuntia.
PISARA	**Influenssa ja RS-virus, ym muuta hengitystieinfektiot**	Suojakäsineet. Kirurginen suu-nenäsuojain. Käsihuuhde.	heikosti emäksinen yleispuhdistusaine	heikosti emäksinen yleispuhdistusaine	Oxivir Sporaside 6% (valmis käyttöliuos), Klorilli 1000 ppm, Oxivir Plus 15%	normaali käytäntö		x	
PISARA	**Covid-19**	Suojakäsineet, FFP2 -hengityssuojain (aerosoleja tuottavien toimenpiteiden jälkeen lisäksi visiiri/suojalasit). Käsihuuhde.	heikosti emäksinen yleispuhdistusaine	heikosti emäksinen yleispuhdistusaine	Oxivir Sporaside 6% (valmis käyttöliuos), Klorilli 1000 ppm, Oxivir Plus 15%	normaali käytäntö		x	
PISARA	**Meningiitti**	Suojakäsineet. Kirurginen suu-nenäsuojain. Käsihuuhde.	heikosti emäksinen yleispuhdistusaine	heikosti emäksinen yleispuhdistusaine	Oxivir Sporaside 6% (valmis käyttöliuos), Klorilli 1000 ppm, Oxivir Plus 15%	normaali käytäntö. INFEKTIOPYYKKI: eritteinen pyykki sulavaan infektiopyykkipussiin, joka laitetaan keltaiseen pussiin			
PISARA	**Hinkuyskä**	Suojakäsineet. Kirurginen suu-nenäsuojain. Käsihuuhde.	heikosti emäksinen yleispuhdistusaine	heikosti emäksinen yleispuhdistusaine	Oxivir Sporaside 6% (valmis käyttöliuos), Klorilli 1000 ppm, Oxivir Plus 15%	normaali käytäntö		x	
ILMA	**Värjäysposition keuhko- tai kurkunpään tuberkuloosi**	FFP2- TAI FFP3-luokan hengitys-suojain (moniresistentti aina FFP3). Käsihuuhde.	heikosti emäksinen yleispuhdistusaine	heikosti emäksinen yleispuhdistusaine	ysköseritteet: Oxivir Sporaside 6% valmis käyttöliuos, Klorilli 1000 ppm, Oxivir Plus 15%	normaali käytäntö. INFEKTIOPYYKKI: märkä ja eritteinen pyykki sulavaan infektiopyykkipussiin, joka laitetaan keltaiseen pussiin			
Varotoimisiivous tehdään mikrokuitupyyhkeillä ja -mopeilla. Eritetahrat, ruhsas hilse ja täi/syyhy/loiset siivotaan kertakäyttöisillä siivouspyyhkeillä. Suihkupäät ja letkut vaihdetaan puhtaisiin / pestään ohjeen mukaisesti. Välineet pyyhitään desinfioivalla puhdistusaineella/ pestään desinfioivassa pesukoneessa siivouksen välkeen.			**Likapyykin normaali käytäntö; pyykki pakataan huolellisesti pyykkipussiin välttäen pöllyttelyä. Eritteinen pyykki pakataan kuivan tekstiilin sisään ja sitten pyykkipussiin.**		**INFEKTIOPYYKKI: kaikki pyykit sulavaan infektiopyykki pussiin, joka laitetaan keltaiseen pussiin**	**Väliverhojen vaihto aina myös, jos niissä on eriteroiskeita.**		Ohje hyväksytty 8/2025