

Suojainten käyttö koronaepäilyn ja koronapotilaan hoidossa asumispalveluissa

- Käytä koronaepäilyn ja koronapotilaan hoidossa venttiilitöntä FFP2-hengityksensuojainta.
- Käytä silmäsuojainta/visiiriä jos asiakkaalla on hengitystieoireita (yskä, nuha).
- Käytä suojakäsineitä aina kun joudut kosketuksiin rikkinäisen ihon, limakalvon tai eritteiden kanssa. Asiakkaan ehjää ihoa voi koskettaa ilman suojakäsineitä, kun huolehtii käsihuuhteen käytöstä ennen ja jälkeen kosketuksen.
- Jos hoito- tai tutkimustilanteessa sinulle tulee vartalokontakti asiakkaaseen tai tilanteessa on vaara roiskeista, käytä silloin myös suojatakkiä.
- Huomioi hyvä käsihygienia suojainten pukemisessa ja riisumisessa.

Suojainten pukeminen

1. Desinfioi kädet
2. Pue venttiilitön FFP2 ja tarvittaessa silmäsuojain
3. Desinfioi kädet
4. Pue tarvittaessa suojatakki
5. Käytä käsihuhdetta ja pue tarvittaessa suojakäsineet juuri ennen asiakas/potilaskosketusta

Suojainten riisuminen

1. Riisu tarvittaessa suojakäsineet ja suojatakki samanaikaisesti
2. Desinfioi kädet ennen kasvojen alueen suojainten riisumista
3. Poista silmäsuojain ja FFP2
4. Desinfioi kädet

