

Eritetahradesinfektio - nopea kaksivaiheinen eritetahradesinfektio vähentää tartuntariskiä

Infektiivien eritteiden roiskeet on syytä poistaa heti niiden synnyttyä desinfektioaineen avulla. Työntekijöiden tulee poistaa eritetahra ja desinfioida mikrobikontaminaatio **heti sen havaittuaan**. Eritekontaminaation aiheuttanut tai sen ensimmäisenä havainnut on vastuussa siitä, että desinfektio tulee tehdyksi. Eritetahradesinfektioon käytettävät desinfektioaineet ja välineet tulee olla helposti saatavilla. (Anttila, 2010)

Osa eritetahradesinfektioon käytettävistä tuotteista voi sisältää nieltynä vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Tämän vuoksi tuotteita ei ole turvallista säilyttää asukashuoneessa. Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteesta löydät myrkyllisyyteen liittyvät tiedot. Kokoa yksikköosi eritahradesinfektiopakki, sopikaa yhteisesti missä pakkia säilytetään ja kenelle sen täydentäminen kuuluu. Säilytyspaikan tulee olla turvallinen asiakkaiden/potilaiden kannalta, ja toisaalta työntekijöillä helposti löydettävissä. Tarkista vähintään vuosittain, että eritetahrapakin tuotteiden käyttöaika on voimassa.

Eritetahradesinfektio - tee se kaksivaiheisesti

- Desinfioi kädet ja pue kertakäyttöiset suojakäsineet.
- Imeytä erite ensin kertakäyttöpyyhkeeseen ja laita likainen pyyhe roskeen. Käytä tähän vaiheeseen vain toista kättäsi.
- Laita eritealueen päälle laajasti puhtaalla käsinekadella desinfektioainetta.
- Pyyhi pinta puhtaalla kertakäyttöpyyhkeellä ja laita pyyhe roskeen.
- Riisu suojakäsineet roskapussiin ja sulje roskapussi.
- Pese ja desinfioi kädet.
- Vaikutusaika on pinnan pyyhintään ja kuivumiseen kulunut aika, jos ei muuta mainita.
- Huolehdi, että erite ja poistamisessa käytettävät välineet eivät levitä mikrobeja edelleen.

Eritetahradesinfektiopakki - kokoa se näin

Kokoa eritetahradesinfektiopakki omaan yksikköosi. Sopikaa yhteisesti, missä pakkia säilytetään. Esimerkiksi huuhteluhuone on hyvä paikka.

Käyttäjä täyttää - periaate on aina, että jätä pakki seuraavalle käyttäjälle täydennettynä käyttövalmiiksi.

Eritetahrapakin sisältö:

- kertakäyttöisiä suojakäsineitä
- eritetahradesinfektioaine (alempana on vaihtoehtoja)
- imeviä kertakäyttöpyyhkeitä
- käsihuuhte
- roskapusseja

Keusoten yksiköt tilaavat HUS Logistiikasta eritetahrojen desinfektioon tarkoitettut tuotteet, yksityiset palveluntuottajat tilaavat tuotteet omista kanavistaan.

- **Valmiit käyttöliuokset** ovat helppo valinta, tuote on voimassa pakkauksessa merkittyyn päivämäärään asti. Laimennettavissa tuotteissa yksikössä tulee huolehtia laimennospullojen pesu ja huolto, sekä merkitä pulloon, kuinka kauan laimennus on käyttökunnossa. **Huomioi, että clostridium difficileen ei tehoa kaikki tuotteet.**

Ensisijainen: Oxivir Plus Spray 750 ml (vetyperoksidi) 3,5 % valmis käyttöliuos, tehoaa norovirus, M. tuberculosis (tuberkuloosi). **Tämä 3.5% käyttöliuos ei tehoa clostridium difficileen.** Säilyvyys 2 vuotta.

Klorilli (klooriyhdiste, kloramin-T) 1 l ja 5 l. 1 000 ppm käyttöliuos (**tehoaa Cl.difficile itiöihin**, acinetobacter baumannii, tbc). Säilyvyys 4 viikkoa. Saatavissa laitoshuollolta.

Lähde: Anttila, VJ.2010. Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta.