

TAVANOMAISTEN VAROTOIMIEN LISÄKSI

KOSKETUSVAROTOIMET GASTROENTERIITTI



SUOJAINTEN PUKEMINEN

Potilashuoneessa tai sulkutilassa

1. Käsien desinfektio
2. Suojatakki tai hihallinen suojaesiliina vartalokontaktissa
3. Suu-nenäsuojus tarvittaessa
4. Silmäsuojaimet tarvittaessa
5. Käsien desinfektio
6. Suojakäsineet huoneen sisäpuolella juuri ennen potilaskosketusta

SUOJAINTEN RIISUMINEN

Aina potilashuoneessa

1. Suojakäsineet
2. Suojatakki
3. Käsien pesu vedellä ja saippualla
4. Käsien desinfektio
5. Suu-nenäsuojus
6. Silmäsuojaimet
7. Käsien desinfektio

VIERAILIJA: Ota yhteyttä hoitohenkilökuntaan.

TAVANOMAISTEN VAROTOIMIEN LISÄKSI KOSKETUSVAROTOIMET




Käsihuuhde aina, suojaimet riskin mukaan, mm. vartalokontaktissa tai kun eriteroiskevaara

SUOJAINTEN PUKEMINEN

Potilashuoneessa tai sulkutilassa

1. Käsien desinfektio
2. Suojatakki tai hihallinen suojaesiliina vartalokontaktissa
3. Suu-nenäsuojus tarvittaessa
4. Silmäsuojaimet tarvittaessa
5. Käsien desinfektio
6. Suojakäsineet tarvittaessa huoneen sisäpuolella juuri ennen potilaskosketusta.



SUOJAINTEN RIISUMINEN

Aina potilashuoneessa

1. Suojakäsineet
2. Suojatakki
3. Käsien desinfektio
4. Silmäsuojaimet
5. Suu-nenäsuojus
6. Käsien desinfektio

TAVANOMAISTEN VAROTOIMIEN LISÄKSI PISARAVAROTOIMET

Kasvojen alueen suojaimia käytetään, kun ollaan alle 2 metrin etäisyydellä potilaasta.



SUOJAINTEN PUKEMINEN Potilashuoneessa tai sulkutilassa

1. Käsien desinfektio
2. Suu-nenäsuojus
3. Silmäsuojaimet
4. Käsien desinfektio

SUOJAINTEN RIISUMINEN Aina potilashuoneessa

1. Käsien desinfektio
2. 2. Silmäsuojaimet
3. 3. Suu-nenäsuojus
4. 4. Käsien desinfektio

Hengitystieinfektiopotilaan kohdalla **tietyissä virustaudeissa ja tilanteissa FFP2-hengityksensuojain**, katso viruskohtaiset infektioidentorjuntaohjeet.

VIERAILIJA: Ota yhteyttä hoitohenkilökuntaan.

TAVANOMAISTEN VAROTOIMIEN LISÄKSI ILMAVAROTOIMET

Ilmavarotoimihuoneessa käytetään aina FFP2/FFP3-hengityksensuojainta.



HENGITYKSENSUOJAIMEN PUKEMINEN

Sulkuhuoneessa tai huoneen
ulkopuolella

1. Käsien desinfektio
2. FFP2/FFP3-hengityksensuojain
3. Käsien desinfektio

Testaa, että hengityksensuojain asettuu tiiviisti kasvoillesi.

VIKAILIJA: Ota yhteyttä hoitohenkilökuntaan.

HENGITYKSENSUOJAIMEN RIISUMINEN

Sulkuhuoneessa tai huoneen
ulkopuolella

1. Käsien desinfektio
2. FFP2/FFP3-hengityksensuojain
3. Käsien desinfektio