

VARO-TOIMI-LUOKAT	MIKROBI/TAUTI	SUOJAIMET JA KÄSIHYGIENIA	SIIVOUSAINE	ERITETÄHRAT	LÄKÄPYYKIN KÄSITTELY	Noco-spray	Loppu-siivous: väli-erhojen vaihto	MUUTA HUOMIOITAVAA
	MRSA	Suojatikki ja suojakäsineet. Jos hilseilevä → kirurginen suur-nenäsuojain. Käsihuuhde.	heikosti emäksinen yleispuhdistusaine	Oxivir Plus 3,5 % valmis käyttöliuos	hilseilevän MRSA potilaan pyykki laetaan sulavaan infektiopyykkipussiin, joka laetaan keitaiseen pussiin		X	
	Acinetob baumannii (Acin MDR)	Suojatikki ja suojakäsineet. Käsihuuhde.	Oxivir Plus 3,5 % Klorilli 1000 ppm	Oxivir Plus 3,5 % valmis käyttöliuos	normaali käytäntö	X	X	
	PseuMDR	Suojatikki ja suojakäsineet. Käsihuuhde.	heikosti emäksinen yleispuhdistusaine	Oxivir Plus 3,5 % valmis käyttöliuos	normaali käytäntö	X	X	
	VRE	Suojatikki ja suojakäsineet. Käsihuuhde.	heikosti emäksinen yleispuhdistusaine	Oxivir Plus 3,5 %	normaali käytäntö		X	
	TAI/SYVHY/LUDE	Suojatikki ja suojakäsineet. Käsihuuhde.	heikosti emäksinen yleispuhdistusaine	Oxivir Plus 3,5 % valmis käyttöliuos	kaikki INFECTIO-PYYKKI sulavaan infektiopyykkipussiin, joka laetaan keitaiseen pussiin			TAI → tavonomaiset varotoimet, LUDE → ilmoitus tuhoaiorjunta yritykseen, huonetta ei tyhjennetä ennen tuhoaiorjuntaohjetta
	Candida auris	Suojatikki ja suojakäsineet. Käsihuuhde ja käsihuuhde.	Oxivir Plus 15 % Klorilli 1000 ppm Kantajan + altistuneen huoneen siivous 2 x pvä	Oxivir Plus 15 % Klorilli 1000 ppm	kaikki INFECTIO-PYYKKI sulavaan infektiopyykkipussiin, joka laetaan keitaiseen pussiin	X	X	Loppusiivouksessa konsultoi hygieniahoitajaa irrotavaroiden hävittämisestä
	ESBL E Coili	Suojatikki ja suojakäsineet. Käsihuuhde.	heikosti emäksinen yleispuhdistusaine	Oxivir Plus 3,5 % valmis käyttöliuos	normaali käytäntö			Tavanomaiset varotoimet riittää, jos potilas ei tuhri eritteliään. Jos potilas on tuhriva => kosketusvarotoimet
	ESBL Klebsiella pneumoniae	Suojatikki ja suojakäsineet. Käsihuuhde.	heikosti emäksinen yleispuhdistusaine	Oxivir Plus 3,5 % valmis käyttöliuos	normaali käytäntö	X	X	Kosketusvarotoimet
	CPE	Suojatikki ja suojakäsineet. Käsihuuhde.	heikosti emäksinen yleispuhdistusaine	Oxivir Plus 3,5 % valmis käyttöliuos	normaali käytäntö	X	X	
	HUOMI ESBL Klebsiella, CPE, Acin MDR- ja Pseu MDR-kantajan huoneen loppusiivous → potilaahuone: Oxivir 3,5 %, saniteettitiat: Klorilli 1000 ppm.							
	Lisäksi kaadetaan laimentamatonta Klorilla WC-aitaaseen 4 dl sekä laittakalvoon 4 dl ja annetaan vaikuttaa 60 min, jonka jälkeen huuhdellaan.							
	Käytä suojalaseja, hengityssuojainta ja kestopöytäisiä suojakäsineitä, kun käsittelet laimentamatonta puhdistusainetta!							
KOSKETUS								

Nimi: Varotoimet taulukossa- Siivouskooste laitoshuollolle 7/2024

Versio: 1

Laatija: Porvali, Tiina

Hyväksyjä: Paula Hiljanen, 4.12.2024 10:45

Voimassaoloaika: 4.12.2025

Dokumentin tyyppi: Toimintaohje

Nimi: Varotoimet taulukossa- Siivouskooste laitoshuollolle 7/2024

Versio: 1

Laatija: Porvali, Tiina

Hyväksyjä: Paula Hiljanen, 4.12.2024 10:45

Voimassaoloaika: 4.12.2025

Dokumentin tyyppi: Toimintaohje

	Chlostridium difficile (gastroenteritti)	Suojatikki ja suojakäsineet, Kirurginen suu-nenäsuojain, Käsihpuhe ja käsihuuhde.	Oxivir Plus 15 % Klorilli 1000 ppm	Klorilli 1000 ppm	Käikkä INF-EKTIOPYYKKI sulavaan infektiopyykkipussiin, joka laitetaan keltaiseen pussiin	X	X			Nocotus - muista hyvä mekaaninen siivous! Konsultoi tarvittaessa INTAR.
	Noro (gastroenteritti)	Suojatikki ja suojakäsineet, Kirurginen suu-nenäsuojain, Käsihpuhe ja käsihuuhde.	Oxivir Plus 3,5 % Klorilli 1000 ppm	Oxivir Plus 3,5 % valmis käyttöliuos Klorilli 1000 ppm	Käikkä INF-EKTIOPYYKKI sulavaan infektiopyykkipussiin, joka laitetaan keltaiseen pussiin	X	X			Nocotus - muista hyvä mekaaninen siivous! Konsultoi tarvittaessa INTAR.
	Influenssa	Suojatikki ja suojakäsineet, Kirurginen suu-nenäsuojain, Käsihuuhde.	heikosti emäksinen yleispuhdistusaine	Oxivir Plus 3,5 % valmis käyttöliuos	normaali käytäntö		X			
	Meningiitti	Suojatikki ja suojakäsineet, Kirurginen suu-nenäsuojain, Käsihuuhde.	heikosti emäksinen yleispuhdistusaine	Oxivir Plus 3,5 % valmis käyttöliuos	normaali käytäntö, ERITTEINEN PYYKKI sulavaan infektiopyykkipussiin, joka laitetaan keltaiseen pussiin					
	Hinkkyskä	Suojatikki ja suojakäsineet, Kirurginen suu-nenäsuojain, Käsihuuhde.	heikosti emäksinen yleispuhdistusaine	Oxivir Plus 3,5 % valmis käyttöliuos	normaali käytäntö		X			
	Varjelysopositiivinen keuhko- tai kurkkupuolen tuberkuloosi	FFP2- TAI FFP3-luokan hengitysuojain (normaalisti aina FFP3), Käsihuuhde.	heikosti emäksinen yleispuhdistusaine	yksosenteit: Oxivir Plus 3,5 % valmis käyttöliuos Klorilli 1000 ppm	normaali käytäntö					
	Covid-19 ja RS-virus	Suojatikki ja suojakäsineet, Kirurginen suu-nenäsuojain, visiri/suojalasit FFP2 (aerosoleja tuottavien toimenpiteiden jälkeen) Käsihuuhde	heikosti emäksinen yleispuhdistusaine	Oxivir Plus 3,5 % valmis käyttöliuos	normaali käytäntö		X			
KOSKETUS /PISARA										

Eristykset siivotaan mikrokuluhyökkäillä ja moppeilla.

Eriohjelmat, runsas hylse ja talvi/syhy/loiset siivotaan kertakäyttöisillä siivousliinnoilla.

Suikupäät ja - leikat vaihdetaan puhtaisiin.

Välilinet pyyhittäin desinfioivalla puhdistusaineella / pestään desinfirovassa pesukoneessa siivouksen jälkeen.

Väliverhojen vaihto aina, jos niissä on eristöskeleitä.

Likapyykin normaali käytäntö: pyykki pakataan huolellisesti pyykkipussin välttämättä pollyttelyä.

Erieteen pyykki pakataan kuvan tekstillä sisään ja sitten pyykkipussiin.

Nimi: Varotoimet taulukossa- Siivouskooste laitoshuollolle 7/2024

Versio: 1

Laatija: Porvali, Tiina

Hyväksyjä: Paula Hiljanen, 4.12.2024 10:45

Voimassaoloaika: 4.12.2025

Dokumentin tyyppi: Toimintaohje

Päivitetty 7/2024